

手術前休薬期間の目安は、あくまでも「目安」ですので、出血リスクと休薬による血栓症・塞栓症発症リスクに応じてご判断ください。

★抜歯、白内障手術、体表の小手術で術後出血への対応が容易な場合等は、ワルファリンや抗血小板療法継続下での実施が推奨されている※1,7。

Table with columns: 分類, 一般名, 商品名, 休薬期間の目安, 消化器内視鏡診療, 単剤, 2剤併用, 3剤併用. Rows include Aspirin, Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixiban, Warfarin, etc.

<参考文献>
※1 「循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に関するガイドライン」2008年 日本循環器学会
※2 「心房細動(薬物)ガイドライン2013年改訂版」日本循環器学会, 日本心臓病学会, 日本心電学会, 日本不整脈学会
※3 「脳卒中治療ガイドライン2009」2009年 日本脳卒中ガイドライン委員会(日本脳卒中学会, 日本脳神経外科学会, 日本神経学会ほか)
※4 「抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン」2012年 日本消化器内視鏡学会
※5 「手術医療の実践ガイドライン」2013年 日本手術医学会
※6 「EHRA PRACTICAL GUIDE」:非弁膜症性心房細動患者における新規抗凝固薬の実用ガイド(2012年), European Heart Rhythm Association
※7 「科学的根拠に基づく抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン2010年版」日本有病者歯科医療学会, 日本口腔外科学会, 日本老年歯科医学会